受けておられればと、今思い出しても残念でなりません。 述べられました。事後措置面談後すぐに大腸内視鏡検査を この方々にお礼の電話をして欲しいと書かれて 生前は6ヶ月ごとに私のところに来られ、毎回 自業自得なんですけどね…」という言葉から話 検査しなさいと言われていたのに、1年近く放置していた自分が悪く、 その後肺にも。 大腸に進行癌が見つか 受けてくださいとお話しました。 定期健康診断での便潜血検査陽性に対する 亡くなられて暫くして奥様からお電話を頂き たいそう忙しい50代の管理職の方がいらっしゃいま 「主人の遺品を整理しておりましたら 後措置面談を行い、大至急大腸内視鏡検査を ましたのでお電話させていただきました」と が出てきまして、 しお辛かったんだろうと思いました。 大腸がん発見後4年半ほどで亡くなられました。 ij 死んだ後に ました。手術後3ヶ月で肝臓に転移 およそ1年後に検査を受けられた時、 し始められ した。

「あれだけ先生に なってきた! がんで亡くなられる方の半分 は治る病気になってきまし リ菌検査【*1】(胃にヘリコバ 視鏡検査(胃カメラ検査)、ピロ 胃がんであれば上部消化管内 治るがんで占められています。 以上が胃がん、大腸がんなどの ないですか?今や「癌(がん)」 治る癌(がんで 健康診断を受けていない方は ・ピロリ菌がいるかどうか を落とさない た。

いです。

い方が多く、

せっかくの医学の

血検査)そのものを受けられな まれている胃カメラ検査・便潜 方はがん検診(人間ドックに含 ます。残念ながら家庭の主婦の

進歩を享受できていない方が多

うになりました。便潜血検査が 鏡検査の普及と相まって大腸 に対する抗体を用いた便潜血 血球の成分であるヘモグロビン かりました。外科手術を受けら 所に典型的な進行がんが見つ で私の患者さんから相談を受 様が便潜血検査陽性とのこと は予後が比較的良好です。 いと思っていませんか。大腸がん で見つかってもどうせ助からな いです(グラフ1)。がんは健診 がん、膵臓がん、乳がんの順に多 女性では大腸がん、肺がん、胃 胃がん、大腸がんの順に多く、 早期撃退の決め手がんの早期発見が れ、30年近く経った今も元気に る方について、男性では肺が たところ、S状結腸という場 日本人のがんで亡くなら 大腸内視鏡検査を行いま 30年ほど前に赤 ん見つかるよ 大腸内視 奥 健康診断や うに精密検査 会うことは随分少なくなり 便潜血検査が含まれてい を受け

う」、「生理が近かったのでその いて、「痔の血が混じったのだろ じるということに鈍感になって で大腸がんが見つかる方がいま 女性のがんで亡くなる方の第 ることはいくらでもあります。 血に大腸がんの血が混じってい れば分かるように、痔や生理の すがちょっと冷静になって考え うからです。気持ちは分かりま 査)を受けないで放置してしま 血が混じったんだわ」というよ る男性です。理由は便に血が混 ほとんどになり、進行がんに出 される大腸がんも早期がんが かっていました。そのうち発見 た。しかし、未だに進行がん 位が大腸がんによる死亡で それは女性もしくは痔のあ ~8%の方に大腸がんが見つ 女性や痔のある男性は、一 (大腸内視鏡検

部位別がん死亡者数 (2014)

(グラフ1)

子宫

6,429人

(4%)

胆囊·胆管

9,065人

(6%)

10,335人

(7%)

国立がん研究センター がん対策情報センター

出典: 厚生労働省「人口動態統計」

日本人の死亡原因第1位は

「がん」

大腸

22,308人

(15%)

20,891人

(14%)

16,420人

(11%)

15,305人

(10%)

〈女性〉

その他

13,240人

(9%)

1 ご 年本 に一度健診を入もご家族も

検査となった際は速やかに受診 発見・早期治療に欠かせませ 健康診断を受けま 年に|度は 定期健康診断は病気の早期 「体の総点検」とし

じっているかどうかを調べ、大 が、便潜血検査です。注意しな らです。この便の中に混じった の組織はもろくて出血しやす じっていると大腸がんの疑い てください。 くさがらずに精密検査を受け あった場合は、怖がらずに面倒 んの可能性があることです。 血検査が陽性であれば大腸が いといけないのは1 わずかな血液を検出できるの ため便にその血液が混入するか 検査です。ではなぜ便に血が混 腸がんの可能性の有無を見る となるのでしょう。大腸がん 便潜血検査で陽性の判定が 回でも便潜

がんは全死亡者のおよそ

3.5人に1人

その他

19,208人

(9%)

お過ごしです。

検査法が開発され、

胆囊·胆管

9,052人

(4%)

食道

9,629人

(4%)

前立腺

11,507人

(5%)

導入された当時は陽性の方の

便潜血検査は、便に血が混

16,411人

(8%)

がんの方がたくさ

〈男性〉

52,505人

(24%)

26,177人 (12%)

31,483人

(14%)

【*1】胃カメラ検査後にピロリ菌除菌治療を受けると、ほとんどの場合、保険診療(3割負担)になります。 【*2】 便潜血検査後に精密検査として大腸内視鏡検査を受けた場合は、保険診療(3割負担)になります。

けることで命を守ることができ 鏡検査【*2】などの検査を受 の検査)、大腸がんであれば便

るかどうかの検査)、大腸内視 潜血検査 (便に血が混じってい 医師から、その思いを、叫びを聞かせていただきました.

日頃から医療の現場で、多くの患者さんと向き合い

Vol.01

日立健康保険組合 顧問医 医師・医学博士

进 正弘 th

● 東京大学医学部卒業後東

大病院第一内科に入局。日 立総合病院、本社診療所、 大学院博士課程,同大学院 医学部助手、同保健センター 非常勤講師を経て2016年 4月より日立健保顧問医。

「なんで…」「どうして…」と、砂を噛むような思いをされてい